



腹痛

- ぐったりしていて泣いてばかりいる。
- お腹をかかえて痛がり、しっかり歩けない。
- 血液の混じったウンチができる。
- お腹がパンパンにふくらんでいる。
- お腹をさわると痛がる。
- おまた（陰のう、股のつけね）を痛がる。
- 腹痛になる前にお腹や腰を強く打った。
- 痛みがだんだんひどくなる。 がまんできないほど痛い。

「はい」が
1つ以上
ある

1つも
「はい」が
ない

- 数日ウンチがでていない。
- ウンチをしたら痛みがやわらいだ。
- おへそのまわりを痛がる。
- がまんできる程度の、軽い痛み。

- 休日急诊診療所
- 救急医療機関



7119番で症状の相談 P.29

お子様の様子を見つつ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。



（連休や年末年始のときは、
翌日に休日急诊診療所や
救急医療機関を受診してください。）

ただし

症状が大きく変わった場合は
休日急诊診療所や救急医療機関を
受診してください。



家庭での対処方法

- ①トイレにいって排便させてみましょう。（浣腸をしてあげるのもよいでしょう。）
- ②腹痛が軽いときは、無理に食べさせないで、水分を少しづつ飲ませ、様子を見ましょう。
- ③「の」の字を描くようにお腹を優しくマッサージしてあげると少し楽になることがあります。